



PROTOCOLLO STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA NEL COMUNE DI BOLLATE

- Ritiro: i gatti da sterilizzare vengono ritirati da 12 ore prima dell'intervento (sera prima, senza supplemento di costi). Al momento del ritiro verrà fatto firmare il consenso informato all'anestesia e alla chirurgia. Se i gatti vengono portati in clinica direttamente dentro la gabbia trappola, a seconda del tempo di permanenza in clinica e del carattere del soggetto, potranno essere o meno trasferiti in una gabbia di degenza nel reparto di day hospital chirurgico dedicato solo ai gatti.
- Sedazione: viene effettuata con l'utilizzo di una combinazione di farmaci sedativi e analgesici che verrà decisa al momento, in base alle condizioni fisiche e caratteriali del paziente.
- Preparazione paziente: controllo microchip, taglio unghie, peso, visita completa (compreso controllo del sesso e se già presente cicatrice di una possibile laparotomia, in tal caso non verrà effettuato nessun intervento ma applicato solo il microchip, se non già presente) Applicazione catetere venoso, trattamenti antiparassitari (endo ed ectoparassiti), somministrazione terapia antibiotica (cefazolina) e antinfiammatoria (onsior) per via intramuscolare, tosatura campo chirurgico. Se alla visita il paziente presenta segni di patologia in corso non compatibile con la chirurgia, quest'ultima viene rimandata e verrà impostata la terapia presso uno stallo o con ricovero in clinica (stallo o ricovero in clinica a pagamento esclusi dalla convenzione con il Comune)
- Induzione anestesia con propofol e mantenimento in anestesia gassosa con isoflorano previa intubazione del paziente. Durante la chirurgia si esegue monitoraggio di: pulsossimetria, capnografia, elettrocardiogramma, temperatura, pressione. I pazienti sono sottoposti a fluidoterapia con ringer lattato durante tutto il corso dell'intervento. Si esegue ulteriore controllo del dolore intraoperatorio con applicazione di anestetico locale (lidocaina) a livello di legamento ovarico o testicoli.
 - . maschio: scrub, orchietomia con legatura interna (no punti esterni), tacca auricolare a sinistra applicazione microchip se non già presente.
 - . femmina: ovariectomia con eventuale isterectomia in caso di interruzione di gravidanza o patologie uterine. Dimensioni ferita ovariectomia circa 2 cm, isterectomia circa 5 cm. In entrambi i casi sutura intradermica riassorbibile (no punti esterni). Tacca auricolare a destra applicazione microchip se non già presente.
- Riveglia monitorato con lampada riscaldante in gabbia trappola o nelle nostre gabbie allestite
- Dimissione: la sera stessa dell'intervento tra le 18 e le 20, il gatto può essere rilasciato direttamente in colonia. In caso di ovariectomia, animali defedati, particolari condizioni metereologiche (pioggia, neve, temperatura sotto zero) la dimissione può essere effettuata il giorno successivo entro le 16 e senza supplementi di costo